

GHEPPIO (*Falco tinnunculus*)

- **Corologia:** paleartico-paleotropicale.
- **Fenologia:** stanziale e nidificante.
- **Trend:** stabilità, incremento in Pianura Padana.
- **SPEC:** 3.
- **Red list:** con minima preoccupazione.

	n.	%
Frequenza (n. U.R.)	26	12,5
Nidificazioni possibili	19	61,29
Nidificazioni probabili	4	12,9
Nidificazioni accertate	8	25,8
Ambienti	9	37,5
Acquatici	0	0
Alberati	3	42,85
Aperti	2	40
Antropizzati	4	66,66

Il Gheppio è senza dubbio il rapace diurno più comune e meglio distribuito nell'Oltrepò pavese e di conseguenza anche nel territorio vogherese, dove occupa il 12,5% dei quadranti. Se consideriamo il fatto che è un predatore territoriale e che è assente dal centro storico e da alcune aree di campagna dove non vi è l'assenza sia di alberi sia di tralicci (utilizzati per nidificare) risulta essere una specie frequente come nidificante.

Esso inoltre conferma la sua plasticità nella scelta del luogo in cui nidificare, utilizzando il 37,5% degli ambienti (24) rilevati nell'area di studio, occupando il 4° posto tra i non-

Passeriformes per varietà di ambienti utilizzati.

Mappa di distribuzione del Gheppio.




Figura 2.7 – La nidiata del 2008 presso la Centrale di Torremenapace, in un vecchio nido di Gazza a circa 30 m di altezza dal suolo. (Paolo Solari).

